AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-7-81818709
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSE MENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

13. Route de la FORET - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 58.39.02

ABONNEMENT ANNUEL

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X. Sous Regisseur de recettes et d'avances AVERTISSEMENTS AGRICOLES 13, Rie de la Forêt - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN Nº 208 (Edition Générale nº 19/81 du 21 Juillet 1981)

VIGNE

MILDIOU

Les conditions climatiques sont toujours favorables à cette maladie. Il est donc impératif de bien maintenir la protection :

- en traitement classique ou avec des produits à base de cymoxanil : renouveler ...
 l'application conseillée dans notre dernier bulletin ;
- avec les produits systémiques, bien maintenir l'intervalle de 14 jours entre deux traitements.

OIDIUM

Maintenir soigneusement la protection avec les soufres, le Rubigan 4 ou le Bayleton 5, de nouveaux foyers apparaissant en Charentes.

Nous rappelons qu'en présence de foyers importants d'oidium, il est utile de réalisezune lutte curative :

- soit avec le dinocap (Karathane) à 30 g de m.a./hl en ajoutant un mouillant et en renouvelant 8 jours après.
- soit avec le permanganate de potassium à 125 g/hl en ajoutant un mauillant spécial et en apportant au moins 600 l/ha. Faire suivre aussitôt après d'un soufre, de préférence en poudrage, en tenant compte des dates limites d'application dans les Charentes (mauvais gouts dans les alcools).

BOTRYTIS - Company of the land of the land

Le stade "fermeture de la grappe" pourra être atteint cette semaine dans certaines parcelles de la zone la plus précoce, stade au cours duquel le second traitement de l'a méthode standard doit être appliqué. Les conditions climatiques sont, jusque là, particulièrement favorables à l'installation de cette maladie.

VERS DE LA GRAPPE

L'importance du vol de deuxième génération d'Eudémis est très variable d'une parcelle à l'autre et l'étalement de celui ci dans le temps risque d'être important.

Il apparaît que les journées du 16 et du 17 juillet ont vu une augmentation notable des captures aux piéges alimentaires. En conséquence, nous conseillons, dans les parcelles n'ayant pas encore reçu de traitement insecticide (dirigé contre le Cochylis), de le réaliser courant de cette semaine avec une matière active suffisamment rémanente.

ARAIGNEE JAUNE

On constate l'extension de certains foyers en Charentes. Il est impératif d'interveni le plus tôt possible dans ces situations.

P.i.463

merie de la Station Postou-Charentes - Directeur Gérant : | THIAULT - Inscription

POMIERS - POIRIERS

TAVELURE ET OIDIUM

Bien maintenir la protection contre ces maladies dans les vergers atteints.

CARPOCAPSE

Bien que l'activité de ce ravageur ait légérement diminué, il convient de continuer à assurer la protection, les risques d'attaques sur jeunes fruits persistant .

MINEUSE CERCLEE

Le vol de deuxième génération se poursuit et les premières pontes ont été déposées à partir de la mi-juillet. Le prochain traitement visant les premières larves, à base de méthomy. ou de méthidation sera à appliquer début de semaine prochaine.

CULTURES LEGUMIERES

TEIGNE DU POIREAU

Nous rappelons qu'en zone précoce, il est impératif de débuter la lutte si cela n'a déjà été fait.

En zone plus tardive, les premières chenilles issues des quelques portes correspondants au début du troisième vol du 15 au 17 juillet vont apparaître vers le 25 date à laquelle un premier traitement sera appliqué.

ROUILLE DU POIREAU

Dès l'apparition des premières pustules sur la hampe florale ou sur les feuilles, il est conseillé d'effectuer une application avec des produits à base de manèbe (160 g/hl), mancozèbe 160 g/hl) ou propinèbe (210 g/hl).

Renouveler la protection en tenant compte de l'évolution du champignon et du lessivage des traitements par les pluies.

RAVAGEURS DU CHOU

Bien surveiller les cultures pour suivre l'évolution des populations de pucerons cendrés et des chenilles défoliatrices (piéride, noctuelle).

n'ayant pas encore requ de traitement insecticide (dirigé contre la Cocnylis), de le

On constate L'extension de certains foyers en Charentes. Il est impératif d'interve

Le Chef de la Circonscription Phytosenitaire.
"POITOU-CHARENTES":

R. GUILLEMENET

Imprimé à la Station le 21 Juillet 1981 Précédente Note : Bulletin n° 206 du 9 Juillet 1981.